

PERIQUITOSMEX



El periquito **pío dominante**.



Los píos dominantes continentales, a diferencia de los australianos, presentan la primera franja de su pecho del mismo color que la máscara y sus coberteras no pierden las ondulaciones (melanina).

Los píos dominantes se pueden encontrar en combinación con otras mutaciones como rostrales, perlados, canelas, diluidos, fallow, opalinos, lacewing, entre otras.

Los píos dominantes aparecieron por primera vez en la década de 1950 en Australia, hoy en día existen varias modificaciones a la variedad, entre ellas tenemos al pío dominante australiano y el pío dominante continental. El pío más común es el pío australiano.

El pío australiano se identifica porque presenta una mancha de color en su cabeza y una especie de cinturón en el vientre, esta cinta puede ser delgada o puede ser muy grande y notoria, ambas manchas, la de la cabeza y la del vientre son del mismo color que la máscara del periquito dependiendo de la línea a la que pertenezcan (blanca si es de línea azul o amarilla si es de línea verde). Además de las manchas mencionadas, los píos dominantes australianos presentan la mayoría de sus plumas coberteras de sus alas de color claro y todas sus remeras dando el aspecto de una barrera de color en sus alas. Así mismo su cola está ausente de melanina por lo que es de color claro dependiendo de la línea a la que pertenezca.

